

Abacavir**Liều người lớn**

Theo chức năng thận

CrCl > 50mL/min	CrCl 10–50mL/min	CrCl < 10mL/min	CVVHDF/CVVHD	CVVH	PNCT
300mg q12h hoặc 600mg q24h			Không có dữ liệu		C

Theo chức năng gan: Child A: 200 mg q12h. Child B, C: Không nên sử dụng

Liều trẻ em: Theo chức năng thận

GFR > 50 ml/min		GFR 30-50 ml/min	GFR 10-29 ml/min	GFR < 10 ml/min	GHI CHÚ
Trẻ từ 3 tháng tuổi được chỉ định:		Không có dữ liệu			Không dùng cho trẻ < 3 tháng tuổi
Chế độ liều 2 lần/ngày 8mg/kg q12h, MAX 300mg/liều	Chế độ liều 1 lần/ngày 16mg/kg q24h, MAX 600mg/ngày				
Nếu trẻ ≥ 14kg có thể dùng liều cụ thể theo cân nặng:					
14 – 19kg	150mg q12h hoặc 300mg q24h				
20 – 24kg	150mg buổi sáng, 300mg buổi tối hoặc 450mg q24h				
≥ 25kg	300mg q12h hoặc 600mg q24h				

Thông số dược động

SKD (F%) ¹	Thức ăn ²	t _{1/2} (giờ) ³	Vd	% gắn kết protein ⁴	Đường tiết niệu		Não		Gan mật		Phổi	Xương khớp
					% TT qua thận ⁵	KNĐT ⁶	% CFS/máu ⁵	KNĐT ⁶	% Mô/máu ⁵	KNĐT ⁶	KNĐT ⁶	KNĐT ⁶
83		1,5	0,86 L/kg	50	1		27-33	-	ND			